

DOKARMIANIE DOLISTNE WINOROŚL

Program ramowy, wymagający dostosowania do indywidualnych warunków uprawowych:

• lokalizacja • gleba • klimat • odmiana • agrotechnika



Dawki nawozów na 1 hektar. Zalecana ilość cieczy użytkowej 500–750 litrów na 1 hektar. Roztwory sporządzać bezpośrednio przed zastosowaniem.

Do wszystkich zabiegów polecamy preparaty **ProAqua** i **FASTER**, poprawiające właściwości fizykochemiczne wody, poprzez co zwiększające skuteczność stosowanych nawozów i środków ochrony roślin.

SUPER S-450 nie miesza się z preparatem **SILVIT**; nie stosować w jednym oprysku.

Zabiegi dolistne.

Termin wykonania zabiegu wg skali BBCH.



BBCH

09-11

13

17

53

63

71

75

77

85

91

koniec pękania
pąków

3. liść

7. liść

widoczne
kwiatostany

wczesne
kwitnienie

zawiązywanie
jagód

rozwój
owoców

rozwój
owoców

dojrzwanie
jagód

po
zbiorach

Zamiennie można stosować: *MAKROVIT OPTY w dawce 2-9 l/ha *MIKROVIT Fe-75 w dawce 0,5-2 l/ha *MIKROVIT Mn-160 w dawce 0,5-2 l/ha *MIKROVIT Zn-112 w dawce 0,5-2 l/ha



INTERMAG

Szczegółowe informacje o nawozach i stymulatorach wzrostu dostępne są na stronach www.intermag.pl oraz www.tytanit.pl.